



**Le soleil est au rendez-vous : tous aux foins !**




### CONSEIL PATURAGE

Les chaleurs de ces derniers jours, qui contrastent fortement avec les températures basses des nuits, et l'absence de pluie ont fortement ralenti la pousse de l'herbe. Le pâturage actuel est de qualité mais avec beaucoup de refus. Un broyage ou une fauche avec topping des parcelles à la sortie des animaux serait judicieux pour permettre une nouvelle pousse homogène des prairies. Les zones les plus séchantes commencent à être pénalisées. Pour ces secteurs, des parcelles fauchées précocement peuvent être introduites dans le tour de pâturage, à condition d'avoir plus de 8 cm d'herbe sur pied. Cela permettra aux pâtures en difficulté de repartir avant le retour des animaux.

C'est aujourd'hui le moment d'éviter la montée en graine des rumex et chardons dans les pâtures, broyez les parcelles les plus sales pour limiter la prolifération de ces adventices.

### CONSEIL FAUCHE

La météo étant favorable, et les plantes ayant déjà atteint le bon stade physiologique, c'est le période idéale pour faire des foins de qualité. Il est préférable de ne pas faucher trop ras la prairie (hauteur d'une main, soit 6-7 cm) pour permettre une meilleure ventilation de l'andain afin de faciliter le séchage. De plus, la repousse est également favorisée par les organes verts présents en surface.



Pousse en kg MS//ha	Couverture de vos besoins par l'herbe selon le chargement			
	20 ares/UGB	30 ares / UGB	40 ares /UGB	50 ares/UGB
10	10%	20%	25%	30%
25	30%	45%	60%	75%
40	45%	70%	95%	120%
55	65%	100%	130%	160%
70	80%	125%	165%	200%

Contacts: Aloïse Célerier (86) 06 58 59 74 20- Pauline Gauthier (16) 05 45 84 43 77 - Anne-Laure Lemaître (17-79)



PRDA Nouvelle-Aquitaine, AEI Agro-écologie  
« développer l'autonomie fourragère et protéique »  
avec le soutien du Conseil Régional et de l'Europe.

